

ALTIPRIM® i ALTIPRIM P®
Rastvori za oralnu upotrebu za odrasle i decu
za grlo i disajne organe

Sastav:

Altiprim®		Altiprim P®	
Aktivni sastojci	U 100 g proizvoda	Aktivni sastojci	U 100 g proizvoda
Tečni vodeno-etanolni ekstrakt korena belog sleza (<i>Althaea officinalis</i>) 1:15	26,0 g	Tečni vodeno-etanolni ekstrakt korena belog sleza (<i>Althaea officinalis</i>) 1:17	30,0 g
Tečni vodeno-etanolni ekstrakt herbe timijana (<i>Thymus vulgaris</i>) 1:2,5	15,0 g	Tečni vodeno-etanolni ekstrakt herbe timijana (<i>Thymus vulgaris</i>) 1:5	10,0 g
Tečni vodeno-etanolni ekstrakt korena jagorčevine (<i>Primula veris</i>) 1:2,5	3,0 g	Tečni vodeno-etanolni ekstrakt korena jagorčevine (<i>Primula veris</i>) 1:2,5	3,0 g
Med	10,8 g	Med	10,8 g

Ostali sastojci: saharoza, konzervansi: natrijum-benzoat.

Namena:

Komponente Altiprim® i Altiprim P® rastvora za oralnu upotrebu povoljno deluju na disajne organe, štite sluznicu ždrela od nadražaja, razređuju gusti bronhijalni sekret, pospešuju izlučivanje sluzi iz bronhija i olakšavaju disanje i iskašljavanje.

Način primene:

ALTIPRIM® – Uzima se četiri puta dnevno po jedna kafena kašika.

Ne sme se prekoračiti preporučena dnevna doza. Pre upotrebe sadržaj bočice promućkati.

ALTIPRIM P® – Uzima se četiri puta dnevno po jedna kafena kašika.

Ne sme se prekoračiti preporučena dnevna doza. Pre upotrebe sadržaj bočice promućkati.

Ne preporučuje se za upotrebu kod dece mlađe od 3 godine starosti.

Pakovanje: Altiprim® 200 ml; Altiprim P® 100 ml.

